

Larver till våra svenska aftonflyn

Av Håkan Elmquist

Aftonflyna är en grupp närbesläktade, medelstora nattflyn. De ser ut som typiska sådana medan deras larver, med undantag för ligusterflyet, är håriga och mer eller mindre färggranna. De kan därför tas för någon typ av spinnarlarver. Storleken hos larverna är ganska likartad och varierar mellan 30–40 mm när de är fullväxta.

Larverna uppehåller sig på normalt på sina värdväxter. De sitter ofta exponerade och är lätta att hitta även under dagtid. Förpuppningen sker på marken där de spinner en kokong med inspunna, döda växtdelar. Samtliga arter övervintrar i puppstadiet. Fjärilarna flyger främst under den tidigare hälften av sommaren. Några arter

förekommer i en andra generation senare på sommaren vilket gör att larverna kan påträffas under längre tid.

1. Ligusterfly *Craniophora ligustri*

Larven är den enda i gruppen som inte är kraftigt behårad eller med bjärta färger. Kroppen är dock täckt av en ytterst tunn och gles behåring. Larven lever på olika buskar och träd som liguster, ask och syren.

2. Åsfly *Moma alpium*

En karakteristisk larv med tre stora, vita fläckar på ryggen (jämför larven av **videspinnare** *Leucoma salicis* som har en dylik fläck på varje ryggsegment.) Värdväxten för åsfly är ek.

3. Lancettvinge *Simyra albovenosa*

Denna larv är mycket typisk. Den kan möjligen ge intryck av någon slags spinnarlarv. Arten är kustbunden och larven lever på olika strandgräs. Även gräs som står i vatten. Larver som trillar i vattnet kan simma genom att vicka sig fram på ytan.

4. Alaftonfly *Acronicta alni*

Larven är under uppväxten svartaktig med vit bakdel och liknar en fågelexkrement. Kroppen är täckt av glest stående, långa hår. Som fullvuxen är larven svart med gula, avlånga tvärflecken på ryggen. Håren är nu årligt tillplattade. Larven lever på olika träd, främst al och björk.

5. Spjutaftonfly *Acronicta cuspis*

Denna larv och de bägge följande kan vid ett första påseende uppfattas som mycket lika. De har snarlik färgteckning och ett mer eller mindre långt utskott eller hårtofs på fjärde kroppsegmentet. Karakteristiskt för larven av spjutaftonfly är den nästan "otympligt" långa och svarta hårtofsen på fjärde segmentet. Den lever huvudsakligen på klibbal.



1. Ligusterfly
Craniophora ligustri



2. Åsfly *Moma alpium*



3. Lancettvinge *Simyra albovenosa*



4. Alaftonfly *Acronicta alni*
Ung larv



4. Alaftonfly *Acronicta alni*. Vuxen larv.



5. Spjutaftonfly *Acronicta cuspis*

6. Treuddtecknat aftonfly *Acronicta tridens*

Larven till denna art har ett kort, svart utskott på fjärde segmentet och ryggbandet, som varierar mellan gult och orange, är delat längs mitten. Larven lever på olika buskar och träd som hagtorn, viden, klibbal och björk. De flesta larvfyndet har gjorts på småvuxna björkar i kanten på torvmossar.

7. Psiaftonfly *Acronicta psi*

Denna larv liknar mest spjutaftonflylarven, men har ett relativt långt, köttigt utskott på fjärde segmentet. Arten är den vanligaste och mest utbredda av dessa tre snarlika arter. Larven lever på diverse buskar och träd.

8. Strecktecknat aftonfly *Acronicta strigosa*

Vårt minsta aftonfly vars larv är grön eller brun med ett violettbrunt ryggband. Den gröna larvformen är inte olik en gaffelsvanslarv. Värdväxter är olika buskar som hagtorn, slån och hägg.

9. Myraftonfly *Acronicta menyanthidis*

Larven är brun-svart med röd sidolinje. Den är knappast förväxlingsbar med någon annan aftonflylarv. Larven liknar möjligen **blygrå lavspinnare** *Eilema lurideola*, men denna är mindre, korthårigare och sidolinjen är mer orange. Myraftonflyet är knutet till fuktiga marker och larven lever på där förekommande växter som vattenklöver, pors, viden och björk.

10. Allmänt aftonfly *Acronicta auricoma*

En variabel larv som förekommer i olika färgformer från svart till orange. Larven lever på diverse växter, främst buskar och träd.



6. Treuddtecknat aftonfly *Acronicta tridens*



6. Treuddtecknat aftonfly *Acronicta tridens*



7. Psiaftonfly *Acronicta psi*



8. Strecktecknat aftonfly *Acronicta strigosa*



9. Myraftonfly *Acronicta menyanthidis*



10. Allmänt aftonfly *Acronicta auricoma*



10. Allmänt aftonfly *Acronicta auricoma*



10. Allmänt aftonfly *Acronicta auricoma*

11. Syreaftonfly *Acronicta rumicis*

Denna brokiga larv varierar ytterst lite och förväxling med någon annan aftonflylarv är därför minimal. Möjligen kan man ta den för en tofsspinnarlarv. Larven lever på olika örter och buskar.

12. Blågrått aftonfly *Acronicta cinerea*

En larv med relativt konstant utseende. Den lever på olika örter och buskar.

13. Lönnaftonfly *Acronicta aceris*

Detta är vårt största aftonfly vars larv har ett unikt utseende med märklig "frisyr". Behåringen varierar från gul-orange. När larven blir oroad rullar den ihop sig och med sin grållt färgade behåring ser den ut som en liten fantasisol. Den lever på lönn, men även en del andra lövträd.

14. Vitt aftonfly *Acronicta leporina*

En larv med ytterst egendomligt utseende. Den är grön eller gul med en tät behåring av tunna, vita eller gula hår. Dessa är riktade bakåt på vänster sida och framåt på den högra. Larven sitter gärna sidledes hoprullad och ser närmast ut som ett mögelangrepp på bladet. Den lever främst på björk och al, men även en del andra lövträd.

15. Storhuvat aftonfly *Acronicta megacephala*

Denna larv med sin glesa behåring har ett utseende som skiljer den från övriga aftonflylarver. Den kan möjligen förväxlas med larven till **barrskogsnunna** *Lymantria monacha*, men har en distinkt, gulaktig och sköldformig fläck på tionde kroppssegmentet. Värdväxten är främst asp, men larven kan även leva på viden.



11. Syreaftonfly *Acronicta rumicis*



12. Blågrått aftonfly *Acronicta cinerea*



13. Lönnaftonfly *Acronicta aceris*



14. Vitt aftonfly *Acronicta leporina*



15. Storhuvat aftonfly *Acronicta megacephala*